

プロトコール番号

子宮頸癌・子宮体癌・卵巣癌

3週毎

カルボプラチン+パクリタキセル (CBDCA+PTX)療法

催吐リスク

中等度

投与プロトコール:1クール21日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		6クールまで
①	パクリタキセル	175mg/m ²	Day1	3時間	
	5%ブドウ糖液 250mL				
②	カルボプラチン	AUC6	Day1	1時間	
	生食 250mL				

プロトコール番号

子宮頸癌・子宮体癌

1週毎

カルボプラチン+パクリタキセル+同時胸部放射線療法 (CBDCA+PTX+RT)療法

催吐リスク

中等度

投与プロトコール:1クール21日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		6クールまで
①	パクリタキセル	35mg/m ²	Day1	3時間	
	5%ブドウ糖液 250mL				
②	カルボプラチン	AUC2	Day1	1時間	
	生食 250mL				

プロトコール番号

子宮頸癌・子宮体癌・卵巣癌

3～4週毎

ベバシズマブ+カルボプラチン+パクリタキセル (BV+CBDCA+PTX)療法

催吐リスク

中等度

投与プロトコール:1クール21～28日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		6クールまで
①	ベバシズマブ 生食100mL	15mg/kg	Day1	使用上の 注意参照	
②	パクリタキセル 5%ブドウ糖液 250mL	175mg/m2	Day1	3時間	
③	カルボプラチン 生食 250mL	AUC6	Day1	1時間	
<p>◆パクリタキセルは初回2時間かけて滴下。問題なければ2回目以降は 1時間に時間短縮可能。 ◆ベバシズマブは初回90分かけて滴下。問題なければ2回目 60分 3回目以降 30分に時間短縮可能。</p>					

プロトコール番号

卵巣癌
4週毎

イリノテカン(CPT-11)療法

投与プロトコール:1クール28日間

催吐リスク
中等度

	投与プロトコール:1クール28日間	投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1、8、15		
①	イリノテカン	100mg/m ²	Day1、8、15	1.5時間	
	5%ブドウ糖液 250mL				

プロトコール番号

子宮肉腫 3週毎 ドキソルビシン+イホマイド (AI)療法					催吐リスク
投与プロトコール:1クール21日間					高度
		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	ドキソルビシン 生食 100mL	25mg/m2	Day1、2	2時間	
②	イホマイド 生食 250mL	2000mg/m2	Day1~5	4時間	