

プロトコール番号

悪性黒色腫・有棘細胞癌・基底細胞癌・パジェット病・ボーエン病
2週毎 ニボルマブ (NIVO)療法

催吐リスク
最小度

投与プロトコール:1クール14日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	ニボルマブ 生食 100mL	240mg	Day1	30分	

プロトコール番号

悪性黒色腫・有棘細胞癌・基底細胞癌・パジェット病・ボーエン病
4週毎 ニボルマブ (NIVO)療法

悪性黒色腫・有棘細胞癌・基底細胞癌・パジェット病・ボーエン病 4週毎 ニボルマブ (NIVO)療法					催吐リスク 最小度
投与プロトコール:1クール28日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	ニボルマブ 生食 100mL	480mg	Day1	30分	

プロトコール番号

悪性黒色腫

3週毎

ペムブロリズマブ (KEY)療法

催吐リスク

最小度

投与プロトコール:1クール21日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	ペムブロリズマブ 生食 100mL	200mg	Day1	30分	

悪性黒色腫

6週毎

ペムブロリズマブ (KEY)療法

催吐リスク

最小度

投与プロトコール:1クール42日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	ペムブロリズマブ 生食 100mL	400mg	Day1	30分	

プロトコール番号

悪性黒色腫

3週毎

ニボルマブ+イピリムマブ (NIVO+IPI)療法

催吐リスク

最小度

投与プロトコール:1クール21日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		4クールまで
①	ニボルマブ	80mg	Day1	30分	
	生食 100mL				
②	イピリムマブ	3mg/kg	Day1	30分	
	生食 100mL				

◆5クール目以降はニボルマブ 療法に移行

プロトコール番号

悪性黒色腫
3～4週毎

ダカルバジン (DTIC)療法

催吐リスク
高度

投与プロトコール: 1クール21～28日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	ダカルバジン 5%ブドウ糖液 250mL	1000mg/m ²	Day1	60分	

プロトコール番号

悪性黒色腫
3週毎

カルボプラチン+パクリタキセル (CBDCA+PTX)療法

催吐リスク
中等度

投与プロトコール:1クール21日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		6クールまで
①	パクリタキセル 5%ブドウ糖液 250mL	225mg/m ²	Day1	3時間	
②	カルボプラチン 生食 250mL	AUC6	Day1	1時間	

プロトコール番号

メルケル細胞癌

2週毎

アベルマブ療法

催吐リスク

最小度

投与プロトコール:1クール14日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	アベルマブ 生食 250mL	10mg/kg	Day1	1時間	

プロトコール番号

血管肉腫
4週毎

パクリタキセル (PTX)療法

催吐リスク
軽度

投与プロトコール:1クール28日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキープ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	パクリタキセル 5%ブドウ糖液 250mL	60~80mg/m ²	Day1、8、15	1時間	

プロトコール番号

血管肉腫
3～4週毎

ドセタキセル (DTX)療法

催吐リスク
軽度

投与プロトコール: 1クール21～28日間		投与量	投与日	投与時間	備考
ルートキーブ輸液	生食 250mL	-	Day1		
①	ドセタキセル 5%ブドウ糖液 250mL	60mg/m2	Day1	1時間	